

Aus dem pathologischen Institut München.

---

Ueber das Verhalten  
der  
**Milz bei Lebercirrhose.**

---

Inaugural - Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde  
in der gesamten Medicin

verfasst und einer

hohen medicinischen Fakultät

der

Kgl. bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

**Friedrich Zimmermann,**  
approb. Arzt aus Hagnau am Bodensee.

---

München 1898.

Kgl. Hofbuchdruckerei Kastner & Lossen.



Aus dem pathologischen Institut München.

---

Ueber das Verhalten  
der  
**Milz bei Lebercirrhose.**

---

Inaugural - Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde  
in der gesamten Medicin

verfasst und einer


hohen medicinischen Fakultät

der

Kgl. bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München  
vorgelegt von

**Friedrich Zimmermann,**

approb. Arzt aus Hagnau am Bodensee.



---

München 1898.

Kgl. Hofbuchdruckerei Kastner & Lossen,

Referent: Herr Obermedicinalrat Prof. Dr. Bollinger.

*Meinen lieben Eltern*

*in*

*dankbarer Verehrung gewidmet.*



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Wohl keines von allen parenchymatösen Organen des menschlichen Körpers ist einem auffallenderem Wechsel in Bezug auf sein Volumen unterworfen, als die Milz.

Ganz abgesehen von der, während der Verdauung in physiologischen Rahmen sich vollziehender Schwankung der Grösse und des Gewichtes, findet man bei allen akuten Infektionskrankheiten Milztumoren vor, deren Häufigkeit allerdings bei den einzelnen Erkrankungen nicht unerheblich differiert.

Was den anatomischen Charakter dieser Art von Milzvergrösserung anbetrifft, so ist er durch folgende Züge gekennzeichnet.

Die durch congestive Hyperämie um das 2—3fache vergrösserte Milz zeigt eine intensiv rote Schnittfläche und ein weiches, leicht abstreifbares, überquellendes Pulpagewebe.

Dass eine so erhebliche Vergrösserung ohne irgendwelche Gewebswucherung thatsächlich statthaben kann, findet seine Erklärung in der anatomischen Struktur der Milz. Denn aller Wahrscheinlichkeit — ganz sicher gestellt ist ja der Blutkreislauf in der Milz noch nicht — ergiesst sich das Blut aus den Arterien direkt zwischen die Zellen der Milzpulpa, indem es in ähnlicher Weise durch dieselben, wie Wasser durch einen Sandhaufen hindurchsickert. Um

zu erklären wie das Blut alsdann in die Milzvenen übergeht, nimmt ein Teil der Autoren an, dass die Venenwandung Oeffnungen besitzt, durch welche das Blut eintritt, ein anderer Teil, so besonders Billroth, ist der Ansicht, dass die Milzvenen aus einer Unzahl kleiner capillärer Venen entstehen, welche im wesentlichen die sogenannte rote Milzpulpa ausmachen.

Wie dem auch sei, soviel ist jedenfalls sicher gestellt, dass die Milz imstande ist relativ viel Blut in sich aufzunehmen.

Die congestive Hyperämie kann ein rasch vorübergehender Zustand sein, nicht selten indessen entwickelt sich aus der plötzlichen Blutüberfüllung, dem akuten Milztumor ein chronischer.

Was des letzteren Entstehung anlangt, so kann er sich, wie eben erwähnt, allmählich aus dem akuten herausentwickeln oder pathologischen Zuständen des Blutes oder endlich mechanischer Stase und Blutüberfüllung des Venensystems sein Dasein verdanken.

Anatomisch unterscheidet sich die chronische Milzvergrösserung von der akuten dadurch, dass es sich bei ihr nicht um eine einfache fluxionäre Hyperämie, sondern um eine Zunahme des Milzgewebes handelt.

Die Hyperplasie kann sich entweder auf sämtliche Bestandteile der Milz erstrecken (leukämischer Milztumor) oder aber nur das bindegewebige Gerüst in Mitleidenschaft ziehen (Stauungsmilztumor). Die weiteren Charakteristika der durch Leukämie alterierten Milz kommen für vorliegende Arbeit nicht in Frage, weshalb auch gleich die, für die Deutung der Natur der Milzschwellung bei Lebercirrhose ungleich

wichtigeren, durch chronische Stauung gesetzten Veränderungen in der Milz besprochen werden sollen. Besteht die Stauung erst kurze Zeit, so ist die Milz vergrössert, blutreich schwarzrot; ist die Stauung aber älteren Datums, so zeigt die Milz im grossen und ganzen eine mässige Vergrösserung, vermehrte Konsistenz, die sich bis zur „cyanotischen Induration“ steigern kann, eine Erscheinung, die durch die Vermehrung des trabekulären Bindegewebes sowohl, als auch durch die Verdickung der Gefässscheiden ihre Erklärung findet.

Nachdem so in grossen Zügen das anatomische Bild der Milztumoren im Allgemeinen fixiert ist, so sei es gestattet, im speziellen auf das Verhalten der Milz bei Lebercirrhose einzugehen.

Es war schon den älteren Aerzten bekannt, dass die Milz bei Erkrankung der Leber häufig anschwillt. Vesalius bemerkt: „in morbis jecoris lienes magni frequentes. hepar scirrhosum lien magnus“; und Bianchi erklärte schon den Consensus zwischen beiden Organen aus der Mechanik des Kreislaufs. Später, so namentlich im Anfang und in der Mitte unseres Jahrhunderts gingen die Ansichten über die Häufigkeit des Milztumors bei Lebercirrhose ziemlich auseinander.

Während Andral und Budd nichts Charakteristisches im Verhalten der Milz gesehen haben wollen, wurde von anderen Autoren, so von Bright, Smith, Oppolzer, Bamberger u. a. der Milztumor nur ausnahmsweise bei der in Frage kommenden Leberaffektion vermisst.

So fand Oppolzer unter 26 zur Sektion ge-

kommenen Fällen nur 4mal und Bamberger unter 34 gar nur 2 mal keine Milzvergrößerung vor.

Es haben sich auch diese Befunde vollkommen bestätigt und heute bildet der Milztumor eine wesentliche Stütze für die Diagnose der interstitiellen Hepatitis, und zwar sowohl derjenigen, welche mit Verkleinerung, als auch jener, welche mit Vergrößerung der Leber verbunden ist.

Wenn auch die Thatsache, dass die Milzschwellung ein ebenso wertvolles wie konstantes Zeichen für die Lebercirrhose ist, als solche schon längere Zeit feststeht, so hat man doch noch keine Uebereinstimmung in der Beurteilung des anatomischen Charakters dieses Tumors erzielt.

Die bis jetzt am meisten verbreitete Ansicht schreibt die Veränderungen der Milz theils einer sekundären Pfortaderstauung, theils einer Bindegewebswucherung zu.

Am Ende liegt auch nichts näher als eine Stauung im Pfortadergebiet für die Milzvergrößerung verantwortlich zu machen. Besteht doch das Wesen der Lebercirrhose in dem Auftreten eines interacinös resp. intraacinös gelegenen Granulationsgewebes, das bei der Umwandlung in schrumpfendes Narbengewebe eine Atrophie des Parenchyms und eine Obliteration von Pfortaderästen bedingt.

Die Verödung von Pfortaderästen in der Leber — denn um die handelt es sich hauptsächlich — kann eine solche Dimension annehmen, dass es zu hochgradigen Störungen in der Cirkulation der Vena portae zu Ascites und andern Stauungserscheinungen, so zu Stauungskatarrh des Magens und Darmes kommt.

Wie schon erwähnt, zählt die herrschende Anschauung auch den Milztumor zu den Folgeerscheinungen eines beeinträchtigten Pfortaderkreislaufes.

So bemerkt Strümpell in seinem Lehrbuch der speziellen Pathologie und Therapie in dieser Hinsicht:

a) Atrophische Cirrhose.

„Neben dem Ascites ist das wichtigste von der Stauung im Pfortadergebiet abhängige Symptom, der Stauungsmilztumor, welcher durch den vermehrten Blutreichtum und eine diffuse Gewebshyperplasie der Milz zustande kommt. Der Milztumor erreicht eine ziemlich beträchtliche Ausdehnung, so dass Vergrösserungen des Organs auf's Doppelte und dreifache nicht selten sind“ . . .

b) Hypertrophische Cirrhose.

„Viel häufiger und gewöhnlich auch schon früher (als der Ascites) entwickelt sich ein chronischer Stauungsmilztumor. Wir sahen wiederholt ziemlich grosse Milztumoren bei nur geringem oder fast fehlendem Ascites.“

In ähnlicher Weise drücken sich Bamberger und Oppolzer aus.

Trotzdem eine solche Erklärung der Aetiologie des Milztumors bei interstitieller Hepatitis ganz plausibel klingt, so ist sie doch nicht ohne Widerspruch geblieben. Während nämlich die citierten Autoren vor allem eine Stauung im Pfortadergebiet für die Milzschwellung verantwortlich machen, legen neuere Forscher der Cirkulationsstörung nur eine untergeordnete Bedeutung bei, und führen teils die Milzvergrösserung auf eine Bindegewebsvermehrung zurück, teils

sehen sie im Auftreten des Milztumors einen selbständigen entzündlichen Prozess.

Die erstere Auffassung vertritt *Liebermeister*, wenn er in seinen „Vorlesungen über spezielle Pathologie und Therapie“ sagt:

„Die Vergrösserung beruht hauptsächlich auf einer Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes, das wuchernde Gewebe zeigt, aber auffallenderweise wenig Neigung zu nachträglicher Schrumpfung. Die Milz ist von fester, derber Konsistenz, auf dem Durchschnitt von dunkler Farbe. Die Vergrösserung der Milz ist im wesentlichen als ein der Bindegewebsvermehrung in der Leber analoger Vorgang anzusehen; doch mag auch die Stauung in der Milzvene zu der Vergrösserung beitragen. Dass aber die Milzvergrösserung nicht etwa, wie man häufig angenommen hat, ausschliesslich von der Stauung abhängig ist, ergibt sich schon daraus, dass sie vorhanden ist in Fällen, in welchen eine wesentliche Stauung im Pfortadergebiet nicht besteht. Ausserdem pflegt die durch einfache Stauung vergrösserte Milz sich später wieder zu verkleinern, während bei der Lebercirrhose die Milzvergrösserung andauernd fortbesteht“.

Als selbständige, entzündliche Erscheinung fasst *Oestreich* den Milztumor in seiner Arbeit „Die Milzschwellung bei Lebercirrhose“ auf:

„Mag auch die Pfortader infolge der Lebercirrhose affiziert bzw. komprimiert werden, die Stauungswirkung scheint in den Wurzeln der Pfortader, speziell in der Milzvene und der Milz selbst nicht so bedeutend zu werden, wie man vielleicht glauben möchte.

Nachdem bereits die Stauungswirkung der sogenannten hypertrophischen Cirrhose zweifelhaft geworden ist, möchte ich sie nicht nur für diese, sondern auch für die sogenannte atrophische Cirrhose einschränken; denn die Untersuchung der frischen und gehärteten Milz lässt nicht allzuviel Sicheres für die Annahme einer Stauung in der Milz übrig. Das Wesen des Milztumors bei Lebercirrhose ist ein selbständiges, von der Leber unabhängiges und beruht auf irritativen Prozessen. Während der ersten Stadien der Cirrhose tritt eine zellige Proliferation (*Hyperplasia pulpa*) ein, welche auch bis in spätere Stadien hinein persistieren kann, oder in mehr indurative Prozesse (Bindegewebsvermehrung) oder in wirkliche Atrophie der Pulpa übergeht. Also auch in späteren Stadien muss nicht eine Zunahme des Bindegewebes vorhanden sein“.

Um nun einen statistischen Beitrag zum Verhalten der Milz bei Lebercirrhose zu leisten, habe ich die während der Jahre 1892—1896 im hiesigen pathologischen Institut zur Sektion gekommenen Fälle, bei denen Lebercirrhose als Haupt- oder als Nebebefund ermittelt wurde, tabellarisch zusammengestellt. Bei der Anlegung der Tabellen wurde neben Alter und Geschlecht hauptsächlich die Todesursache und das makroskopische Verhalten von Leber und Milz berücksichtigt. Im Ganzen wurde in den 5 Jahren bei 106 Autopsieen interstitielle Hepatitis konstatiert, und zwar 63 mal die hypertrophische, 43 mal die atrophische Form.

Von diesen 106 Fällen von Lebercirrhose starben die wenigsten — nur 15 — an den Folgen der interstitiellen Hepatitis, die meisten an andern interkurrenten

Erkrankungen; es muss daher vor Allem des Einflusses der letzteren auf die Milz gedacht werden, um bei den einzelnen Fällen entscheiden zu können, was von den Veränderungen in der Milz der Cirrhose, was der den Tod herbeigeführten Erkrankung angehört.

Als häufigste Todesursache tritt uns die Erkrankung des Herzens und der Gefässe entgegen, eine Erscheinung, die vielleicht in der Aetiologie der in Frage kommenden Leberaffektion ihre Begründung findet.

Die hierbei in der Milz gefundenen Alterationen sind erfahrungsgemäss Stauungsprozesse, die sich durch dunkelcyanotische Farbe, vermehrtes Gerüst, derbere Konsistenz (ev. cyanotische Induration) dokumentieren.

Findet sich also in einem mit Herz- oder Gefässerkrankung komplizierten Falle von Lebercirrhose ein weicher Milztumor vor, so ist er nicht auf Rechnung der ersteren, sondern auf die der Lebererkrankung zu setzen.

Eine geringere Einwirkung als die eben erwähnten Affektionen des Herzens und der Gefässe auf die Milz hat die T u b e r k u l o s e, wenigstens in ihrem chronischen Stadium. Denn die Lungenphtise erzeugt eine Milzschwellung nur unter besonderen Umständen, welche entweder durch einen mehr akuten Verlauf, oder durch Stauung vom rechten Herzen her, oder durch das Auftreten einer Amyloiderkrankung, oder durch das Bestehen allgemeiner Miliartuberkulose gegeben sind; bei einfacher chronischer Lungenphtise bleibt die Milz gewöhnlich klein, so dass eine Milzvergrösserung bei Lebercirrhose, die mit chronischer

Lungentuberkulose vergesellschaftet ist, stets auf erstere zurückzuführen sein dürfte.

Schliesslich erübrigt es noch einer anderen Komplikation zu gedenken, die uns bei der folgenden Zusammenstellung häufig entgegen treten wird, nämlich der Pneumonie. Nach Mosler soll bei normal verlaufender Lungenentzündung ein Milztumor für gewöhnlich nicht zu beobachten, dagegen in allen schweren Fällen konstant nachweisbar sein. Diese Befunde am Lebenden sind auch durch Sektionen vollauf bestätigt worden.

So fand Lucas in 70% aller Fälle von lethal verlaufener Pneumonie eine acute infektiöse Milzschwellung vor. Eine solche Veränderung in der Milz bringt die erwähnte Lungenaffektion wohl nur in einem vorher ganz intakten Organe, sicherlich nicht in einer durch chronische Stauung indurierten Milz zu stande. Diese Ueberlegung lässt den Schluss gerechtfertigt erscheinen, dass, wenn bei der Komplikation von Lebercirrhose mit croupöser Pneumonie, wohl auch mit andern acuten Infektionskrankheiten, ein infektiöser Milztumor angetroffen wird, vorher erhebliche Stauungsprozesse in der Milz nicht bestanden haben können.

Nachdem die für uns hier als Todesursache hauptsächlich in Betracht kommenden Erkrankungen erwähnt, und ihre Beziehungen zur Milz erörtert sind, will ich jetzt auf die einzelnen Fälle selbst eingehen. Unter den 43 atrophischen Lebercirrhosen finden sich 21 nicht komplizierte d. h. solche, bei denen neben der Cirrhose entweder eine andere Erkrankung überhaupt nicht, oder doch nur eine der-

artige bestanden hat, die erfahrungsgemäss keinen Einfluss auf die Milz ausübt; hierher gehören, um bei den gegebenen Beispielen zu bleiben, plötzlicher Tod durch Unfälle, Suicidium etc. bei sonst gesunden Cirrhotikern, das Carcinom, wenigstens das nicht jauchig zerfallene, und wie wir oben gesehen haben auch die chronische Lungentuberkulose.

Zweifelsohne wird die Erkenntnis der Milzveränderungen bei interstitieller Hepatitis durch sogestaltete Fälle am meisten gefördert, da das anatomische Bild durch keine anderweitigen Erkrankungen getrübt wird. Bei der Untersuchung der Milz in den 21 Fällen unkomplizierter atrophischer Lebercirrhose repräsentiert sich dieselbe 17 mal als Tumor, und zwar schwankt dessen Grösse — das Gewicht der normalen Milz als 140—160 gr angenommen — zwischen 180 und 570 gr.

Was die Qualität der Milzschwellung anbetrifft, so zeigt sich, dass letztere in 10 Fällen ihre Entstehung im wesentlichen einer Zunahme der Pulpasubstanz verdankt; denn dafür spricht neben dem geringen Blutgehalt die weiche Consistenz und das musartige Vorquellen der Pulpa.

In den übrigen 6 Fällen — einmal fehlt die Angabe über die nähere Beschaffenheit der Milz — erscheint die Milz in der Gestalt eines derben Tumors; es besteht zwar eine Zunahme des interstitiellen Gewebes, allein die Consistenz der Milz entspricht doch nicht derjenigen, welche durch blosse Bindegewebsvermehrung hervorgebracht würde. Man ist also anzunehmen gezwungen, dass auch eine Zunahme der Pulpa an der Milzvergrösserung beteiligt ist, und

die Vermehrung des Bindegewebes und die Induration höchst wahrscheinlich sekundärer Natur sind.

Gehen wir nun auf die komplizierten Fälle von Lebercirrhose über, und beurteilen mit aller Vorsicht nach den obigen Auseinandersetzungen das Verhalten der Milz.

Bei den 11 mit Herz-Gefäss- und Nierenerkrankungen vergesellschafteten Fällen 1893 (92)<sup>1)</sup> 1894 (158) (341), 1895 (471) (580) (691), 1896 (224) (351) (726) (735) (740) zeigt die Milz in 6 derselben eine Vergrösserung und zwar tritt dieselbe in 5 Fällen als derber und in einem Falle 1896 (351) als weicher Tumor in die Erscheinung. Wieviel von der derben Milzschwellung der Cirrhose, wieviel der Komplikation angehört, lässt sich nicht wohl ermitteln, da, wie wir gesehen haben, diese Art von Erkrankungen in der Milz eine Stauung und somit eine Consistenzvermehrung hervorbringt. Die weiche Milzvergrösserung dagegen muss ohne Zweifel auf die interstitielle Hepatitis bezogen werden. Mehr Schlüsse über den Anteil der Lebercirrhose an der Milzveränderung lassen sich aus den Milzbefunden der 11 mit acuten Infektionskrankheiten komplizierten Fällen ziehen. 1892 (541), 1894 (62), (279), (724), 1895 (7), (127), (309), (313), (415), 1896 (254), (302).

In diesen imponiert die Milz in 8 Fällen als Tumor, 5mal als derber und 3mal als weicher. Das Verhalten der Milz in den ersten 5 Fällen lässt darauf schliessen, dass in derselben infolge der Lebercirrhose Veränderungen vor sich gingen, die eine

---

<sup>1)</sup> Die Zahl in Parenthese bedeutet die betreffende Nummer im Sektionsjournal.

acute infektiöse Milzschwellung nicht aufkommen liessen. Dass nun diese Veränderungen einzig und allein durch Vermehrung des Bindegewebes zu stande kamen, dürfte kaum anzunehmen sein, denn einerseits ist die Masse des Bindegewebes doch nicht reichlich genug, um die meistens 3 --4fache Vergrösserung zu erklären, andererseits ist auch die Consistenz nicht diejenige, wie man sie bei reiner Induration anzutreffen pflegt; wie dem auch sei, jedenfalls war letztere gross genug, um einen Einfluss der Infektions-erkrankung auf die Milz hintanzuhalten.

Wenn ich nun das Verhalten der Milz bei der atrophischen Lebercirrhose resumieren soll, so würde ich folgendes sagen: Die Veränderungen in der Milz beruhen hauptsächlich auf einer Vermehrung des Pulpagewebes, die das Gepräge eines entzündlichen Prozesses an sich trägt, und zu der sekundär eine Vermehrung des Bindegewebes, eine Induration treten kann.

Dass die Alterationen der Milz bei der atrophischen Form der interstitiellen Hepatitis fast ausschliesslich durch Stauung im Pfortadergebiet verursacht werden, war in keinem einzigen Fall nachzuweisen; im Gegenteil zeigen die Fälle 1892 (355), 1894 (62), 1896 (332) zur Evidenz, dass trotz Ascites, trotz Stauungskatarrh des Magendarmkanales, also trotz den hervorstechendsten Symptomen von Stauung im Pfortadergebiet, eine solche in der Milzvene nicht zu bestehen braucht. Auch findet die Annahme einer Stauung im

Pfortadersystem in dem geringen Blutgehalt der derben Milztumoren keine Stütze.

Es wäre also demnach der Milztumor nicht sekundärer, sondern primärer Natur.

Betrachten wir nun das Verhalten der Milz bei der hypertrophischen Lebercirrhose.

Die Einteilung in komplizierte und nicht komplizierte Fälle ist nach den gleichen Gesichtspunkten wie bei der atrophischen Form geschehen.

Bei den 23 Fällen unkomplizierter hypertrophischer Lebercirrhose wurde in 19 eine Milzvergrösserung festgestellt. 1892 (191), (270), (303), (623), (697), 1893 (633), (683), 1894 (51), (67), (123), (199), (537), 1895 (159), (210), (397), 1896 (413), (431), (804), (1035), in den 4 Fällen 1892 (472, 1894 (675) 1895 (349), (940) liess sich eine solche nicht nachweisen.

Von den 19 Milztumoren führen 10 (weiche) ihre Entstehung auf eine Hyperplasie der Pulpa, 8 (derbe) auf eine Zunahme der ganzen Substanz, also auch des bindegewebigen Gerüsts, zurück.

Dass thatsächlich die Vergrösserung nicht bloss auf einer Hypertrophie des Gerüsts, sondern auch auf einer solchen des Parenchyms beruhen muss, zeigt nach meiner Ansicht der Fall 1892 (191) zur Genüge. Es hätte sich bei diesem ganz sicher eine viel derbere nicht nur eine „zähe“ Konsistenz gefunden, wäre die über 1000 g wiegende Milz nur durch Bindegewebsvermehrung vergrössert gewesen.

Die 20 mit Herz-, Gefäss- oder Nierenerkrankung komplizierten Fällen weisen nur in zweien keinen 1894 (285), 1896 (542), in 18 dagegen einen Milztumor auf,

1892 (52), (735), (761), 1893 (438), (528), (661), 1894 (169), (244), (345) 1895 (218), (297), (306), (489), 1896 (452), (497), (658), (666), (685), und zwar zeigt sich derselbe in der einen Hälfte der Fälle in der weichen, in der andern in der derben Form.

Während die in der zuletzt angeführten Weise veränderte Milz in mehr oder weniger grosser Abhängigkeit von der komplizierenden Erkrankung steht, ist im Gegensatz dazu die weiche Milzschwellung von derselben ganz und gar unabhängig, und deshalb nur als Folge der Lebercirrhose anzusehen.

Der Befund der Milz bei den 18 von akuten Infektionskrankheiten begleiteten hypertrophischen Lebercirrhosen beweist, wenn auch indirekt, dass besonders grosse Veränderungen indurativer Art in der Milz nicht stattgehabt haben können, da von 14 Milztumoren 1892 (234), (337), (397), (729), (752), 1893 (236), (252), (324), 1894 (99), 1895 (194), (472), 1896 (77), (89), (1019) — in 4 Fällen 1895 (514), 1896 (292), (601), (968) bestand keine — nur 4, scheinbar durch die Leberaffektion so umgestaltet waren, dass sie sich dem Einfluss der Infektionserkrankung entziehen konnten.

Des näheren Vorganges bei dieser Umgestaltung ist schon bei der atrophischen Lebercirrhose Erwähnung geschehen.

Nach alledem scheint der Milztumor auch bei der hypertrophischen Form der interstitiellen Hepatitis durch eine Hyperplasie des Pulpagewebes mit nachfolgender Vermehrung des bindegewebigen Gerüsts bedingt zu sein, denn wie liesse sich das Vorkommen einer weichen entzündlichen Milzschwellung neben

einer derben anders erklären als durch die Annahme, dass die zellige Hyperplasie der Pulpa mit der Zeit zu einem mehr indurativen Prozesse werden kann.

Wenn, wie die am meisten verbreitete Ansicht annimmt, eine Stauung in den Wurzeln der Pfortader, die Erscheinungen in der Milz hervorrufen würde, so könnte es doch wohl niemals zu einem weichen, einen entzündlichen Charakter tragendem Milztumor kommen, denn die Milz reagiert erfahrungsgemäss auf jede Stauung sehr bald mit einer Konsistenzvermehrung. Aber auch noch andere Momente machen eine Stauungswirkung ziemlich unwahrscheinlich, denn selbst ausgeprägte Stauungserscheinungen im Gebiet der Vena portarum können, wie die Fälle 1894 (123) 1896 (497) zeigen, in der Milz keinerlei Veränderungen setzen, die auf eine Stauung schliessen liessen.

Ich glaube daher dargethan zu haben, dass die Milzschwellung bei beiden Formen der Lebercirrhose in erster Linie nicht auf einer Stauung — in manchen Fällen mag sie vielleicht eine Rolle spielen — sondern auf einem entzündlichen Vorgang beruht, der wahrscheinlich dadurch zustande kommt, dass die Schädigungen, welche auf die Leber wirken, auch auf die Milz ihren Einfluss ausüben.

---

Zum Schlusse erübrigt mir noch die angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Obermedizinalrat Prof. Dr. Bollinger für die gütige Anregung und freundliche Unterstützung bei der Anfertigung dieser Arbeit meinen besten Dank auszusprechen.

## Kurze Übersicht der zusammengestellten Fälle:

### Atrophische Cirrhose.

A. Unkomplizierte atr. Lebercirrhosen,  
21 Fälle.

- a) Milz war vergrößert in 17 Fällen,
  - α. weicher Milztumor in 10 Fällen,
  - β. derber Milztumor in 7 Fällen,
- b) Milz war nicht vergrößert in 4 Fällen.

B. Komplizierte atr. Lebercirrhosen,  
22 Fälle.

- 1. Mit Herz- Gefäß- oder Nierenerkrankung  
11 Fälle.
  - a) Milz war vergrößert in 6 Fällen,
    - α. weiche Schwellung in 1 Falle,
    - β. derbe Schwellung in 5 Fällen,
  - b) Milz war nicht vergrößert in 5 Fällen,
- 2. mit akuten Infektionskrankheiten 11 Fälle,
  - a) Milz vergrößert 8 Fälle,
    - α. weicher Tumor 3 Fälle,
    - β. harter Tumor 5 „
  - b) Milz nicht vergrößert 3 Fälle.

### Hypertrophische Cirrhose.

A. Unkompl. hypertr. Lebercirrhosen,  
23 Fälle.

- a) Milz vergrößert 19 Fälle,
  - α. weicher Tumor 10 „

- β. derber Tumor 8 Fälle, (1 unbest.),
- b) Milz nicht vergrößert 4 Fälle.

B. Komplizierte hypertr. Lebercirrhosen,  
38 Fälle.

1. Mit Herz- Gefäß- oder Nierenerkrankung  
20 Fälle,
    - a) Milz vergrößert 18 Fälle,
      - α. weich 9 Fälle,
      - β. derb 9 „
    - b) Milz nicht vergrößert 2 Fälle,
  2. mit akuten Infektionskrankheiten 18 Fälle,
    - b) Milz vergrößert 14 Fälle,
      - α. weich 10 Fälle,
      - β. hart 4 Fälle,
    - b) Milz nicht vergrößert 4 Fälle.
-

# I. Atrophische Lebercirrhose.

| Jahr | Nr.  | Name und Alter des Sectierten | Todesursache                                           | Körpergewicht in kg | Leber-volumen in gr | Milz-volumen in gr | Nähere Beschaffenheit der Milz                         | Bemerkungen             |
|------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1892 | *39  | A. A. 52 J.                   | m. Cirrhosis hepatis.                                  | 82                  | 1530                | fehlt              | Um das Doppelte vergrößert, mässig derb, blutreich.    | Allg. Anasarca Ascites. |
|      | *82  | R. X. ?                       | m. CO-vergiftung.                                      | 62                  | 1470                | 205                | Vergrößert, weich.                                     |                         |
|      | *355 | H. C. 33                      | m. Cirrhosis hepatis.                                  | 64                  | 1290                | 530                | Pulpa weich, Blutgehalt gering.                        | Ascites.                |
| 1893 | 92   | L. Th. 49                     | w. Endocarditis chron. der Mitralis u. Tri-cuspidalis. | 46                  | 1020                | 460                | Derb, Blutgehalt gering, Trabekel deutlich.            | Ascites, Polatrix.      |
|      | *531 | K. W. ?                       | m. Suicidium.                                          | 58                  | 1220                | 215                | Pulpa verdickt, Gerüst vermehrt.                       |                         |
|      | 541  | X. K. 54                      | m. Pneumonia croup.                                    | 64                  | 1080                | 375                | Kapsel verdickt, Pulpa blutarm; trab. Gerüst deutlich. | Ascites; allg. Hydrops. |

\* unkomplizierte Fälle.

|      |      |             |    |                                                                                  |    |      |     |                                                                                                                  |                                      |
|------|------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1894 | *43  | H. R. 24 J. | w. | Tuberculosis pulm.<br>chronica.                                                  | 36 | 1510 | 154 | Mässig vergrössert,<br>derb. Blutgehalt<br>gering.                                                               |                                      |
|      | 62   | D. J. 51    | m. | Tuberculosis mili-<br>aris acuta.                                                | 69 | 1730 | 375 | Doppelt vergröss.,<br>Pulpa vermehrt,<br>Trabekel deutlich.                                                      | Ascites hae-<br>morrhagic.<br>Potat. |
|      | 158  | S. Th. 72   | m. | Hypertroph. et Di-<br>latatio cordis, Ne-<br>phritis chron. inter-<br>stitialis. | 82 | 1560 | 160 | Sehr klein, Pulpa<br>braunrot.                                                                                   |                                      |
|      | 279  | W. N. 44    | m. | Pleuritis tubercul.<br>acuta.                                                    | 44 | 1010 | 120 | Pulpa weich, saft-<br>reich.                                                                                     |                                      |
|      | 341  | H. M. 43    | w. | Endocarditischron.                                                               | 68 | 1500 | 365 | Vergrössert, Kon-<br>sistenz sehr derb,<br>Schnittfläche dun-<br>kelrot, stark ver-<br>mehrtes Binde-<br>gewebe. | Allg. hochgra-<br>dige Stauung.      |
|      | *617 | L. Th. 37   | m. | Tuberculosis pulm.<br>chronica.                                                  | 46 | 1820 | 350 | Vergrössert, Kapsel<br>verdickt, Konsist.<br>zäh, Gerüst ver-<br>mehrt.                                          |                                      |

| Jahrgang | Nummer<br>des Sect. | Name und<br>Alter<br>des<br>Sectierten | schlecht | Todesursache                                          | Körper-<br>gewicht<br>in kg | Leber-<br>volumen<br>in gr | Milz-<br>volumen<br>in gr | Nähere Beschaffen-<br>heit der Milz                    | Bemerkungen |
|----------|---------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1894     | 724                 | Sch. M. 50                             | m.       | Peritonitis ex perforatione. (Tuberk. Darmgeschwüre.) | 69                          | 1545                       | 285                       | Zieml. gross, Pulpa zurücksinkend. Gerüst vermehrt.    | Ascites.    |
| 1895     | 7                   | O. J. 59                               | m.       | Pleuritis tubercul. acuta.                            | 53                          | 1410                       | 350                       | Doppelt vergrössert, dunkelbraunrot.                   |             |
|          | *9                  | D. E. 57                               | m.       | Carcinoma oesoph.                                     | 41                          | 1550                       | 150                       | Kapsel runzelig, Pulpa zurücksinkend, blassbraun.      |             |
|          | *70                 | Sch. C. 35                             | m.       | Verblutung durch Angiom.                              | 66                          | 1040                       | 250                       | Etwas vergrössert, Pulpa vorquellend, Gerüst vermehrt. |             |
|          | 127                 | H. A. 69                               | m.       | Lobuläre Pneumonie.                                   | 67                          | 1550                       | 340                       | Dunkelbraunrote Schnittfläche, derbe Konsistenz.       | Potator.    |
|          | *147                | W. M. 45                               | m.       | Traumat. Erweich. im l. Schläfenlapp.                 | 55                          | 1645                       | 260                       | Weiche Konsistenz, Pulpa überquell.                    |             |

|      |      |          |    |                                        |      |      |     |                                                                                                                          |
|------|------|----------|----|----------------------------------------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1895 | *179 | M. C. 64 | m. | Tubercul. pulm.<br>chronica.           | 43,5 | 1550 | 220 | Konsistenz schlaff,<br>Pulpa blass, Gerüst<br>deutlich.                                                                  |
|      | 309  | P. E. 45 | m. | Tubercul. pulmon.<br>acut. et subacut. | 55   | 1270 | 190 | Weiche Konsistenz.                                                                                                       |
|      | 313  | E. K. 43 | m. | Pleuritis tubercul.<br>acuta.          | 42   | 1320 | 120 | Von gewöhnlichem<br>Umfang; derb.<br><br>Mydogenera-<br>tio et dilatatio<br>cordis Hydro-<br>cephalus ext.<br>et intern. |
|      | *85  | K. G. 50 | m. | Tubercul. pulmon.<br>chronica.         | 57,5 | 1390 | 445 | Kapsel verdickt,<br>Pulpa weich.                                                                                         |
|      | *332 | B. W. 31 | m. | Cirrhosis hepatis.                     | 52   | 1270 | 350 | Erhebl. vergröss.,<br>Pulpa hyperplast.                                                                                  |
|      | 415  | J. W. 47 | m. | Pleuritis haemor-<br>rhagica.          | 48   | 1550 | 460 | Stauungs-<br>katarh des<br>Magens und<br>Darmes.                                                                         |
|      | 471  | G. G. 57 | m. | Hypertrophia et<br>dilatatio cordis.   | 57   | 1540 | 190 | Volumen gehörig,<br>Blutgehalt mässig.                                                                                   |

| Jahrgang | Nummer<br>des Sect. | Name und<br>Alter<br>des<br>Sectierten | Ge-<br>schlecht | Todesursache                                                                              | Körper-<br>gewicht<br>in kg | Leber-<br>volumen<br>in gr | Milz-<br>volumen<br>in gr | Nähere Beschaffen-<br>heit der Milz                                                                   | Bemerkungen                                                        |
|----------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1895     | 580                 | F. N. 66                               | m.              | Pericarditis adhae-<br>siva.                                                              | 50                          | 1100                       | 150                       | Stark verdickte<br>Kapsel, starke cya-<br>not. Induration, Ge-<br>rüst vermehrt,<br>Pulpa atrophisch. | Cyanot. Indu-<br>rat. d. Nieren.<br>Hypertrophie<br>beid. Ventrik. |
|          | 691                 | P. J. 53                               | m.              | Genuine Schrumpf-<br>niere.                                                               | 39,5                        | 1130                       | 125                       | Kapsel runzelig,<br>Pulpa zurücksink.,<br>Gerüst vermehrt.                                            | Potator.                                                           |
| 1896     | *22                 | P. J. 51                               | m.              | Cirrhosis hepatis.                                                                        | Es fehlt<br>die<br>Angabe.  | 1570                       | 570                       | Stark vergrössert,<br>Kapsel verdickt,<br>Pulpa zurücksin-<br>kend, Gerüst hy-<br>pertrophisch.       | Ascites.                                                           |
|          | *145                | H. N. ?                                | m.              | Autochtone<br>Thrombe der<br>Mesenterialarterie,<br>haemorrhag. In-<br>faret d. Darmwand. | dto.                        | 790                        | 150                       | Runzelige, stark<br>fibrös verdickte<br>Kapsel, Pulpa zu-<br>rücksinkend,<br>Gerüst vermehrt.         |                                                                    |

| 1896 | 224  | F. 52    | m. | Pericard. fibrinosa.                | 62            | 1420 | 760 | Kapsel verdickt, Schnittfläche dunkelbraunrot, sehr bluthaltig (Stauungsmilz). |
|------|------|----------|----|-------------------------------------|---------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |          |    |                                     |               |      |     |                                                                                |
|      | 254  | D. K. 19 | m. | Pneumonia croup.                    | 26            | 825  | 55  | Sehr klein, blutarm.                                                           |
|      | 302  | B. J. 42 | m. | Peritonit. tubercul. haemorrhagica. | 65            | 1340 | 290 | Doppelt vergröss., Pulpa leicht vorquellend, ziemlich blutarm.                 |
|      | 351  | R. M. 64 | m. | Nephritis chronica interstitialis.  | Angabe fehlt. | 1220 | 270 | Vergrössert, Pulpa vorquellend, leicht abstreifbar.                            |
|      | *356 | K. J. 36 | m. | Tuberculosis pulm. chronica.        | dto.          | 1235 | 520 | Sehr vergrössert, weich.                                                       |
|      | *363 | D. L. 62 | m. | Carcinoma coli.                     | 57            | 1370 | 210 | Grösse gehörig, Parenchym mässig derb.                                         |
|      | *579 | J. M. 64 | m. | Cirrhosis hepatis.                  | 69            | 1480 | 520 | Vergrössert, Parenchym braunrot, weich, Gerüst undeutlich.                     |

Potator

| Jahrgang | Nummer<br>des Sect. | Name und<br>Alter<br>des<br>Sectierten | Ge-<br>schlecht | Todesursache                | Körper-<br>gewicht<br>in kg | Leber-<br>volumen<br>in gr   | Milz-<br>volumen<br>in gr | Nähere Beschaffen-<br>heit der Milz                                                           | Bemerkungen                                                             |
|----------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1896     | *603                | G. S. 44                               | m.              | Cirrhosis hepatis.          | 39                          | 900                          | 250                       | Im Längsdurch-<br>messer vergrößert.                                                          | Ascit. inflam-<br>mat. Peritonit.<br>tubere.                            |
|          | *628                | J. A. 44                               | m.              | Tubercul. pulmon.<br>chron. | 46,5                        | 900                          | 205                       | Kapsel verdickt,<br>Parenchym schlaff,<br>vorquellend, blut-<br>reich, nicht ver-<br>größert. | Ascit. Miliar-<br>tubere. des<br>Oment. maj.<br>u. d. Zwөрch-<br>fells. |
|          | *642                | R. F. 58                               | w.              | Carcinoma uteri.            | Fehlt die<br>Angabe         | 1100                         | 150                       | Pulpa blassbraun,<br>zurücksinkend.                                                           |                                                                         |
|          | 726                 | G. A. 54                               | w.              | Myocarditis fibrosa.        | dto.                        | 1300                         | 200                       | Etwas vergrößert,<br>Kapsel gespannt,<br>Pulpa „zurücksink.“                                  | Stauungs-<br>organe.                                                    |
|          | 735                 | M. v. K. 66                            | m.              | Endocarditis chron.         | dto.                        | Bedeut.<br>verklei-<br>nert. | Sehr<br>klein.            | Kapsel verdickt,<br>Pulpa derb, zurück-<br>sinkend.<br>Gerüst vermehrt,<br>nicht vergrößert.  | Stauungs-<br>nieren.                                                    |

|      |      |           |    |                                            |                     |      |     |                                                                      |                                                    |
|------|------|-----------|----|--------------------------------------------|---------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1896 | 740  | Pf. R. 77 | w. | Idiopath. Hyper-<br>troph. u. Dilat. cord. | Fehlt die<br>Angabe | 1100 | 150 | Brüch., Pulpaleicht<br>überquellend.                                 | Ascites, Stau-<br>ungskatarrh d.<br>Mag. u. Darms. |
|      | *773 | St. J. 73 | m. | Carcinoma ventr.                           | 57                  | 1200 | 180 | Etwas vergrößert,<br>Pulpa zurücksin-<br>kend, Gerüst ver-<br>mehrt. |                                                    |

## II. Hypertrophische Lebercirrhose.

| Jahrgang | Numer<br>des Sect. | Name und<br>Alter<br>des<br>Sectierten | Ge-<br>schlecht | Todesursache                         | Körper-<br>gewicht<br>in kg | Leber-<br>volumen<br>in gr | Milz-<br>volumen<br>in gr | Nähere Beschaffen-<br>heit der Milz                                              | Bemerkungen                                                              |
|----------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1892     | 52                 | P. S. 34 J.                            | m.              | Hypertrophie und<br>Dilatat. cordis. | 88                          | 2580                       | 510                       | Zieml. vergrössert,<br>Pulpa vorquellend.                                        | Stauungskat.<br>d. Magens u.<br>Darmes.                                  |
|          | *191               | A. E. 45                               | m.              | Cirrhosis hepatis.                   | 52                          | 2200                       | 1000                      | 4—5fach vergröss.<br>Blutgehalt nicht<br>besonders; zäh.                         | Anasarca der<br>unt. Extremit.<br>coradiposum<br>Dilat. ventr.<br>dextr. |
|          | 234                | W. W. 47                               | m.              | Peritonitis purul.                   | 74                          | 2070                       | 350                       | Um $\frac{1}{3}$ vergrössert.<br>Kapsel verdickt.                                |                                                                          |
|          | *270               | R. M. 39                               | m.              | Tuberc. pulmon.<br>chron.            | 49                          | 1720                       | 225                       | Um die Hälfte ver-<br>grössert, Pulpa<br>überquellend, Blut-<br>gehalt vermehrt. |                                                                          |
|          | *303               | W. J. 32                               | m.              | Tuberc. pulmon.<br>recurrens.        | 57                          | 1930                       | 275                       | In allen Durch-<br>messern vergröss.<br>Pulpa hyperplast.                        |                                                                          |

\* unkomplizierte Fälle.

| 337  | G. Th. 44        | w. | Pneumonia croup.                           | 46            | 2100          | 220 | Derb, blutarm.                                             |                           |
|------|------------------|----|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 397  | P. A. 21         | m. | Tuberc. pulmon. subacuta.                  | 46,5          | Angabe fehlt. | 182 | Mässiggross, Pulpa überquellend, saftreich.                | Potator.                  |
| *472 | Fehlt die Angabe | m. | Suicidium.                                 | 63            | 2010          | 95  | Weich, Blutgehalt gering.                                  |                           |
| *623 | E. K. 55         | m. | Carcinoma recti.                           | 61            | 1900          | 212 | Etwas vergrössert, ziemlich zähe.                          |                           |
| *697 | G. L. 45         | m. | Carcin. oesophag.                          | 74            | 1880          | 370 | Vergröss., brüchig, Pulpa hervortret.                      |                           |
| 729  | H. B. 40         | m. | Pneumonia croup.                           | 78            | 3310          | 310 | Pulpa hervorquell., saftreich.                             | Leichter Ascites.         |
| 735  | M. L. 49         | m. | Pneumonia croup.                           | 62,5          | 2570          | 310 | Um das Doppelte vergrössert, derb, Blutgehalt vermindert.  | Hypert. und Dilat. cordis |
| 752  | E. K. 2          | w. | Lobäre Pneumonie.                          | 8,5           | 400           | 40  | Vergrössert, Konsistenz vermehrt, Pulpa wenig abstreifbar. |                           |
| 761  | B. N. 62         | m. | Sclerosis aortae Hypert. u. Dilat. cordis. | Angabe fehlt. | 2020          | 500 | 3fach vergrössert, derb, blutreich.                        |                           |

| Jahrgang | Numer<br>des Sect. | Name und<br>Alter<br>des<br>Societen | Geschlecht | Todesursache       | Körper-<br>gewicht<br>in kg | Leber-<br>volumen<br>in gr | Milz-<br>volumen<br>in gr | Nähere Beschaffen-<br>heit der Milz                                                        | Bemerkungen                                          |
|----------|--------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1893     | 236                | P. J. 59                             | m.         | Pneumonia croup.   | 62                          | 2200                       | 245                       | Etwas vergrößert,<br>schneidet sich<br>weich.                                              |                                                      |
|          | 252                | B. B. 40                             | m.         | Septicaemie.       | 62                          | 1920                       | 220                       | In allen Durchmes-<br>sem vergrößert,<br>schneidet sich<br>weich, Pulpa über-<br>quellend. |                                                      |
|          | 324                | R. S. 54                             | m.         | Pneumonia croup.   | 79                          | 2420                       | 285                       | Vergröss., schnei-<br>det sich weich,<br>Pulpa hypertroph.                                 | Potator                                              |
|          | 438                | v. G. B. 46                          | m.         | Carcinom. ventric. | 58                          | 2510                       | 370                       | Vergrößert. derb.                                                                          | Hypert. und<br>Dilat. cordis<br>Stauungsniel.        |
|          | 528                | N. N. 50                             | w.         | Obesitas cordis.   | Angabe<br>fehlt.            | 1970                       | Angabe<br>fehlt.          | Vergröss., äusserst<br>brüchig.                                                            |                                                      |
|          | *633               | L. F. 62                             | m.         | Cirrhosis hepatis. | 81                          | 2350                       | 850                       | 4fach vergrößert,<br>blut- und saftarm,<br>Pulpa atrophisch<br>(Stauungsmilz).             | Stauungs-<br>katarrh des<br>Magens und<br>Dünndarms. |

|      |      |           |    |                                                      |      |      |     |                                                                               |                       |
|------|------|-----------|----|------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1893 | 661  | K. Ch. 39 | w. | Adipositas cordis.                                   | 83   | 2150 | 231 | Vergrössert, weich,<br>Pulpa vorquellend.                                     |                       |
|      | *683 | J. J. 45  | m. | Cirrhosis hepatis.                                   | 50,5 | 2960 | 480 | Kapsel verdickt,<br>Pulpa blassbraun,<br>(Stauungsmilz).                      | Potator               |
| 1894 | *51  | G. B. 33  | m. | Suicidium.                                           | 70   | 2600 | 194 | Vergrössert, rot-<br>braun, blutreich.                                        | Potator               |
|      | *67  | J. M. 24  | m. | Tubercul. pulm.<br>chron.                            | 61   | 2030 | 180 | Kapsel schlaff,<br>Pulpa braunrot, auf<br>der Schnittfläche<br>zurücksinkend. |                       |
|      | 99   | F. K. 33  | m. | Pneumonia group.                                     | 78   | 2700 | 175 | Etwas Hyperplasie<br>der Pulpa.                                               |                       |
|      | *123 | N. Z. 40  | m. | Cirrhosis hepatis.                                   | 94   | 3090 | 290 | Kapsel verlickt,<br>Konsistenz weich.                                         | Ascites Po-<br>tator. |
|      | 169  | W. M. 38  | m. | Hypertr. u. Dilat.<br>cordis.                        | 73   | 2620 | 430 | Bedeut. vergröss.,<br>blutreich, Pulpa<br>überquellend.                       | Potator.              |
|      | *199 | Z. H. 50  | m. | Cirrhosis hepatis<br>primäres Carcinom<br>der Leber. | 75   | 3720 | 470 | Kapsel verdickt,<br>Pulpa zurücksin-<br>kend, blassbraun.                     |                       |

| Jahrgang | Numer<br>des Sect.<br>Journ. | Name und<br>Alter<br>des<br>Sectierten | Geschlecht | Todesursache                                       | Körper-<br>gewicht<br>in kg | Leber-<br>volumen<br>in gr | Milz-<br>volumen<br>in gr | Nähere Beschaffen-<br>heit der Milz                                                        | Bemerkungen                      |
|----------|------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1894     | 244                          | v. R. B. 69 J.                         | w.         | Myodegenerat.<br>cordis.                           | 60                          | 2320                       | 186                       | Etwas vergrößert,<br>weich.                                                                |                                  |
|          | 285                          | H. A. 75                               | m.         | Hypert. u. Dilatat.<br>cordis.                     | 84                          | 1995                       | 165                       | Kapsel verdickt,<br>schneidet sich<br>weich; Trabekel<br>deutlich, Blutge-<br>halt gering. | Leichter As-<br>cites.           |
|          | 345                          | O. K. 46                               | m.         | Endocard. chron.                                   | 80                          | 1950                       | 340                       | Doppelt vergröß.,<br>Konsistenz derb,<br>Gerüst stark ver-<br>mehrt.                       | Potator,<br>Stauungs-<br>organe. |
|          | 421                          | U. A. 1 1/2                            | w.         | Diphtheria faucium<br>gangraenosa.                 | 6,5                         | 400                        | 305                       | Bedeutend vergröß-<br>sert, sehr derb, Ge-<br>rüst vermehrt.                               | Anaemia<br>splenica.             |
|          | *537                         | W. F. 43                               | m.         | Intestinale Dia-<br>pesisblutung.                  | 67                          | 2000                       | 270                       | Pulpa weich, Ge-<br>rüst deutlich.                                                         |                                  |
|          | *675                         | W. J. 61                               | m          | Apoplexie in der<br>Gegend der capsula<br>interna. | 52,5                        | 1770                       | 152                       | Weiche Konsistenz.                                                                         |                                  |

|                  |      |             |    |                                            |     |      |     |                                                                                  |                                            |
|------------------|------|-------------|----|--------------------------------------------|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1895             | *159 | K. P. 25 J. | m. | Tubercul. pulm.<br>chron.                  | 52  | 1910 | 235 | Pulpa braunrot,<br>überquellend.                                                 |                                            |
|                  | 194  | M. J. 78    | m. | Erysipelas faciei.                         | 70  | 2610 | 280 | Kapsel verdickt,<br>Konsistenz derb,<br>Gerüst vermehrt.                         | Stauungs-<br>katarrh des<br>Magens.        |
|                  | *210 | K. F. ?     | m. | Tubercul. pulm.<br>chron.                  | 52  | 2040 | 240 | Organ schlaff,<br>Pulpa zurücksink.                                              |                                            |
|                  | 218  | G. P. 51    | m. | Idiopath. Hypertr.<br>u. Dilatatio cordis. | 100 | 2230 | 320 | Stark vergrößert,<br>von weich teigiger<br>Konsistenz, Blut-<br>gehalt vermehrt. | Potator.                                   |
|                  | 297  | A. K. 49    | m. | Pericardit. adhaes.                        | 79  | 1680 | 180 | Etwas geschwellt,<br>Gewebe ziemlich<br>weich, Trabekel<br>deutlich.             |                                            |
|                  | 306  | B. K. ?     | m. | Sarcoma cerebri.                           | 73  | 1890 | 335 | Schneidet sich derb.                                                             | Stauungsniere<br>Endocardit.<br>verrucosa. |
| c <sub>2</sub> * | *349 | S. A. 71    | m. | Cirrhosis hepatis.                         | 68  | 1720 | 190 | Kapsel zeigt Peri-<br>splenitis fibrosa,<br>Parenchym blut-<br>arm.              | Ascites, Gas-<br>tritis pigmen-<br>tosa.   |

| Jahrgang | Nr. des Sect.-Journ. | Name und Alter des Secierten | Ge-<br>schlecht | Todesursache                            | Körper-<br>gewicht<br>in kg | Leber-<br>volumen<br>in gr | Milz-<br>volumen<br>in gr | Nähere Beschaffen-<br>heit der Milz                                                                                                | Bemerkungen     |
|----------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1895     | *397                 | O. O. 43 J.                  | m.              | Cirrhosis hepatis.                      | 53                          | 2445                       | 1150                      | 5—6fach vergrößert; sie schneidet sich weich; Pulpa stark gewuchert, überquellend, Blutgehalt gering, Trabekel schwach angedeutet. |                 |
|          | 472                  | St. J. 51                    | m.              | Sepsis.                                 | 74                          | 2360                       | 640                       | Stark vergrößert, äusserst weich und schlaff.                                                                                      |                 |
|          | 489                  | R. A. 26                     | m.              | Idiopath. Hypertr. u. Dilatatio cordis. | 73                          | 2130                       | 330                       | Vergrößert, Parenchym dunkel, leberartige Härte.                                                                                   | Stauungsorgane. |
|          | 514                  | J. O. 67                     | m.              | Pneumon. croup.                         | 67                          | 1950                       | 95                        | Kapsel verdickt, Pulpa weich.                                                                                                      |                 |
|          | *940                 | K. L. ?                      | m.              | Fraktur des Schädels.                   | 47,5                        | 1770                       | 78                        | Ziemlich klein, Kapsel runzelig, Blutgehalt vermindert.                                                                            |                 |

|      |      |            |    |                           |                  |      |     |                                                                                                    |
|------|------|------------|----|---------------------------|------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1896 | 77   | H. K. 61   | w. | Pneumon. croup.           | 81,5             | 2170 | 285 | Etwas vergrössert,<br>Kapsel verdickt,<br>Pulpa etwas vor-<br>quellend.                            |
|      | 89   | N. G. ?    | m. | Pneumon. croup.           | 57               | 2050 | 205 | Etwas vergrössert,<br>Kapsel gerunzelt,<br>Pulpa weich, Blut-<br>gehalt gering.                    |
|      | 292  | Sch. K. 36 | m. | Sepsis.                   | 95,5             | 2730 | 155 | Klein, schlaff,<br>weich, Gerüst ver-<br>mehrt.                                                    |
|      | *413 | N. 67      | m. | Cirrhosis hepatis.        | Angabe<br>fehlt. | 2000 | 310 | Vergröss., Kapsel<br>verdickt, Pulpa<br>weich, schmierig,<br>vorquellend, Gerüst<br>sehr deutlich. |
|      | *431 | B. C. 34   | w. | Tubercul. pulm.<br>chron. | 52               | 2350 | 320 | Stark vergrössert,<br>sehr weich, Pulpa<br>überquellend, Ge-<br>rüst kaum sichtbar.                |
|      | 452  | M. S. 36   | m. | Pericarditis chron.       | Angabe<br>fehlt. | 2350 | 800 | Erhebl. vergrössert,<br>Kapsel verdickt,<br>Pulpa vorquellend,<br>Gerüst verdeckt.                 |

| Jahrgang | Nummer<br>des Sect. | Lame und<br>Alter<br>des<br>Sectierten | Ge-<br>schlecht | Todesursache                            | Körper-<br>gewicht<br>in kg | Leber-<br>volumen<br>in gr | Milz-<br>volumen<br>in gr | Nähere Beschaffen-<br>heit der Milz                                                                | Bemerkungen                                      |
|----------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1896     | 497                 | B. J. 42 J.                            | m.              | Adipositas cordis.                      | 96                          | 2400                       | 630                       | Beträchtlich ver-<br>grössert, Kapsel<br>gespannt, verdickt,<br>Pulpa musartig<br>vorquellend.     | Stauungs-<br>katarrh des<br>Magens und<br>Darms. |
|          | 542                 | G. K. 57                               | w.              | Myodegeneratio<br>cordis.               | 73                          | 2140                       | 150                       | Kapsel gerunzelt,<br>Parenchym weich,<br>Gerüst undeutlich.                                        |                                                  |
|          | 601                 | E. G. 38                               | m.              | Pneumon. croup.                         | 64                          | 2210                       | 130                       | Kapsel runzelig,<br>Parenchym weich.                                                               |                                                  |
|          | 658                 | S. M. 55                               | m.              | Idiopath. Hypertr.<br>u. Dilat. cordis. | 69,5                        | 2270                       | 345                       | Fast doppelt ver-<br>grössert, Kapsel<br>verdickt, Pulpa<br>nicht abstreifbar,<br>Gerüst vermehrt. | Potator,<br>Stauungs-<br>indur. der<br>Nieren.   |
|          | 666                 | H. J. 28                               | m.              | Idiopath. Hypertr.<br>et dilat. cordis. | Angabe<br>fehlt.            | 2000                       | 100                       | Gespannte Kapsel,<br>Pulpa nicht über-<br>quellend, Gerüst<br>etwas vermehrt.                      | Potator,<br>Stauungs-<br>indur. der<br>Nieren.   |

|      |       |          |    |                                         |                  |      |     |                                                                                                                |                                                                               |
|------|-------|----------|----|-----------------------------------------|------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1896 | 685   | R. N. 66 | m. | Idiopath. Hypertr.<br>et dilat. cordis. | 66               | 2090 | 460 | Doppelt vergröss.,<br>Konsistenz sehr<br>derb. Gerüst deutl.                                                   | Stauungs-<br>nieren.                                                          |
|      | *804  | W. M. 61 | w. | Pankreascarcinom.                       | 40               | 2040 | 240 | Ziemlich schlaff,<br>Pulpa dunkelbraun.                                                                        |                                                                               |
|      | 968   | M. O. 57 | m. | Septicaemie.                            | 64               | 2000 | 175 | Von mässiger<br>Grösse, schneidet<br>sich weich, ist<br>blutarm.                                               |                                                                               |
|      | 1019  | W. J. 33 | m. | Pneumonia croup.                        | Angabe<br>fehlt. | 2835 | 300 | Vergrössert, Pulpa<br>anaemisch, zurück-<br>sinkend; Gerüst<br>deutlich.                                       |                                                                               |
|      | *1035 | M. D. 66 | m. | Carcinose periton.                      | Angabe<br>fehlt. | 2210 | 190 | Kapsel mit fibrösen<br>Auflagerungen,<br>Pulpa zieml. derb,<br>Gerüst vermehrt.                                |                                                                               |
|      | 1048  | K. F. 29 | w. | Cirrhosis hepatis.                      | 54               | 2250 | 365 | Doppelt vergröss.,<br>Kapsel verdickt,<br>Schnittfläche dun-<br>kelbraun, derb,<br>Gerüst nicht ver-<br>mehrt. | Vitium cordis.<br>Beginnende<br>Amyloid-<br>degen. der<br>Milz und<br>Nieren. |

## Litteratur.

---

- Bamberger, Krankheiten des chylopoëtischen Systemes.  
Bianchi, Historia hepatica.  
Billroth, Zur pathologischen Anatomie der Milz. Virch. Arch. Bd. 23.  
Bollinger, Atlas und Grundriss der patholog. Anatomie.  
Frerichs, Klinik der Leberkrankheiten.  
Liebermeister, Vorlesungen über Pathologie u. Therapie V.  
Lucas, Inaugural-Dissertation. Ueber Grössenverhältnisse der Milz bei croupöser Pneumonie.  
Müller, Ueber den feineren Bau der Milz.  
Mosler, Ueber ansteckende Formen der Lungenentzündung.  
Oestreich, Milzschwellung bei Lebercirrhose. Virch. Arch. Bd. 142.  
Oppolzer, Prager Vierteljahresschrift I. 3.  
Praelectiones academ. institut. rei medic.  
Sokoloff, Venöse Hyperaemie der Milz. Virch. Arch. Bd. 112.  
Strümpell, Spezielle Pathologie und Therapie.  
Ziegler, Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie.
-



